

www.lslandViewGastro.com

TEXTO / LLAMAR AL: 805-641-6525

Hola, su cita esta programada con el:	
Dr	
Su asistente es:	
Si tienes alguna pregunta puedo	
communicarse a la extensión:	

ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL SUPERIOR ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)

Su médico le ha pedido que se someta a un examen para visualizar el interior del esófago (tubo de tragado), el estomagó y el duodeno.

Su endoscopia esta programada para		
Por favor registrese a las:	en la siguiente ubicació	n.

OVentura Endoscopy Center (VEC)-5810 Ralston St. Suite 101, Ventura, CA 93003

OCommunity Memorial Hospital (CMH) - 147 N. Brent St. Ventura, CA 93003 (Mountain Tower)

OVentura County Medical Center (VCMC) - 300 Hillmont Ave. Ventura, CA 93003 (Admitting)

SE DEBE CONTINUAR EL MEDICAMENTO PARA LA PRESIÓN ARTERIAL

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO DEJE DE TOMAR DILUYENTES DE SANDRE (por ejemplo, PLAVIX, COUMADIN, WARFARIN, o ACEITE DE PESCADO)

* Tylenol Extra Strength está BIEN tomar para reemplazar MEDICAMENTOS DE ASPIRINA o IBUPROFENO* A MENOS QUE SU MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO*

EVITE SEMILLAS, NUECES Y GRANOS DE MAÍZ 2 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

Preparación para el Procedimiento

La noche antes del procedimiento, NO SE LE PERMITE comer nada después de las 7:00 p.m. NINGUN TIPO DE ALIMENTOS SÓLIDOS. Solo puede tomar *líquidos claros hasta la medianoche. Después de esto no podrá beber nada hasta después del procedimiento. NO ALIMENTOS SÓLIDOS por la mañana, puede beber pequeños sorbos de líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento, solo pequeños sorbos de agua si es necesario.

Ejemplos de líquidos claros: NADA ROJO

- Agua
- Café y té (sin crema, leche ni productos lácteos)
- Jugos de color claro o claros
- Bebidas deportivas
- Caldo de pollo, res o vegetales
- Refrescos claros
- Gelatina y gelatina sin colorantes

*Si toma algún medicamento <u>no</u> mencionado anteriormente, puede continuar tomándolos si no pueden esperar.

MUY IMPORTANTE-DEBE TENER TRANSPORTACION. ¡YA QUE SERA LIGERAMENTE SEDADO E INCAPAZ DE CONDUCIR!! NO SE PERMITE USAR: UBER/LYFT/TAXI/ TRANSPORTE PÚBLICO A MENOS QUE SEA ACOMPAÑADO POR UN ADULTO RESPONSABLE (18 AÑOS).

ESTARAS ALLÍ APROXIMADAMENTE 2 ½ HRS DESDE SU TIEMPO DE REGISTRACION

Durante el procedimiento:

Se pondrá una bata de hospital y se le dará medicamento por vía intravenosa para adormecerlo. Su médico puede tratar la parte posterior de la garganta con un aerosol o espray para adormecerla. Cuando se relajó correctamente, el endoscopio se coloca en la boca y se le pedirá que trague. Esto se hace fácilmente por el efecto relajante de la medicación. El tubo no va a interferir con su respiración. Si hay alguna pregunta de una anormalidad, una biopsia (delgada pieza de tejido) se tomarán para el examen microscópico. Si se detecta un pólipo (crecimiento de hongo), éste será removido y enviado a patología para un examen más detenido.

Después del procedimiento:

Tan pronto como se retira el tubo, es posible que eructar el aire, que ha sido atrapado en el estómago durante el examen. Malestar después de la endoscopia se limita generalmente a dolor leve de la garganta, que puede durar uno o dos días. Después de que se completa la endoscopia, el médico será capaz de discutir el hallazgo del examen con usted y su compañero/conductor. Es muy importante de hacer arreglos para que alguien lo transporte al centro / hospital y llevar a casa. Algunas personas se sentirán con sueño y confundidos después del examen y se olvidan de las instrucciones o las conclusiones dadas por el médico. Si no está seguro acerca de cualquier información dada a usted, por favor llame a la oficina para una breve cita de seguimiento o deje un número donde el médico puede devolverle la llamada.

*Si se toman biopsias, que usualmente llamamos pacientes dentro de 1-2 semanas con resultados. Si usted no oye de nosotros, por favor llame a nuestra oficina al (805) 641-6525 al menos 2 semanas después del procedimiento para los resultados.

TENGA EN CUENTA: Si se toma una biopsia, el hospital o el centro le facturarán por separado laboratorio.