



[www.IslandViewGastro.com](http://www.IslandViewGastro.com)

TEXTO / LLAMAR AL:805-641-6525

Hola, su cita esta programada con el:

Dr. \_\_\_\_\_

Su asistente es:

Si tienes alguna pregunta puedo

comunicarse a la extensión: \_\_\_\_\_

### **PROCTOSIGMOIDOSCOPY (FLEX)**

El médico le ha pedido que se someta a un examen para visualizar todo su colon.

Su colonoscopia está programada para \_\_\_\_\_

Por favor regístrese a las: \_\_\_\_\_ en la siguiente ubicación.

- **Ventura Endoscopy Center (VEC)**-5810 Ralston St. Suite 101, Ventura, CA 93003
- **Community Memorial Hospital (CMH)** - 147 N. Brent St. Ventura, CA 93003 (Mountain Tower)
- **Ventura County Medical Center (VCMC)** - 300 Hillmont Ave. Ventura, CA 93003 (Admitting)

### **\*SE DEBE CONTINUAR EL MEDICAMENTO PARA LA PRESIÓN ARTERIAL\***

\* Tylenol Extra Strength está BIEN tomar para reemplazar MEDICAMENTOS DE ASPIRINA o IBUPROFENO\* A MENOS QUE SU MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO\*

\*EVITE SEMILLAS, NUECES Y GRANOS DE MAÍZ 2 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO\*

\*Si toma algún medicamento no mencionado anteriormente, puede continuar tomándolos si no pueden esperar.

### **Preparación para el Procedimiento**

1. Compre **dos (2) enemas** de flota regular (**Fleet Enemas**), asegúrese que NO sean enemas de aceite mineral. Estos enemas están disponibles en la mayoría de las farmacias. (Continúe a la siguiente página)

2. La noche antes del procedimiento, no debe tener nada que comer o beber después de la medianoche.
3. El primer **(1) enema** de flota se administrará a las \_\_\_\_\_ A.M.
4. El segundo **(2) enema** de flota se administrará a las \_\_\_\_\_ A.M.

**MUY IMPORTANTE-DEBE TENER TRANSPORTACION. ¡YA QUE SERA LIGERAMENTE SEDADO E INCAPAZ DE CONDUCIR!! NO SE PERMITE USAR: UBER/LYFT/TAXI/ TRANSPORTE PÚBLICO A MENOS QUE SEA ACOMPAÑADO POR UN ADULTO RESPONSABLE (18 AÑOS).**

**\*ESTÁRA ALLÍ APROXIMADAMENTE 2 ½ HRS DESDE SU TIEMPO DE REGISTRACION\***

#### **Durante el procedimiento:**

Se pondrá una bata de hospital y se le dará medicamento por vía intravenosa para adormecerlo. Cuando se relajó correctamente, el tubo sigmoidoscopio flexible será colocado en el recto y maniobrar a través de la parte inferior del intestino. Usted puede sentir algo de hinchazón y cólicos ocasionales durante el procedimiento, pero se harán todos los esfuerzos para minimizar las molestias. Si hay alguna pregunta de una anomalía, una biopsia (delgada pieza de tejido) se tomará para el examen microscópico. Si se detecta un pólipo (crecimiento similar a un hongo), éste será removido y enviado a patología para un examen más detenido.

#### **Después del procedimiento:**

Tan pronto como se retira el tubo colonoscópico, se puede sentir la necesidad de pasar gas por el recto. Esto es completamente normal, como considerables cantidades de aire han quedado atrapados en el intestino durante el examen. A menudo hay hinchazón y calambres durante una hora o dos después de la colonoscopia hasta que pase el gas. Después de que se completa la endoscopia, el médico será capaz de discutir el hallazgo del examen con usted y su compañero / conductor. Es muy importante de hacer arreglos para que alguien lo transporte al centro / hospital y llevar a casa. Algunas personas se sentirán con sueño y confundidos después del examen y se olvidan de las instrucciones o las conclusiones dadas por el médico. Si no está seguro acerca de cualquier información dada a usted, por favor llame a la oficina para una breve cita de seguimiento o deje un número donde el médico puede devolverle la llamada.

**\*Si se toman biopsias**, que usualmente llamamos pacientes dentro de 1-2 semanas con resultados. Si usted no oye de nosotros, por favor llame a nuestra oficina al (805) 641-6525 al menos 2 semanas después del procedimiento para los resultados.

**TENGA EN CUENTA: Si se toma una biopsia, el hospital o el centro le facturarán por separado laboratorio.**